

Nutriprem breastmilk fortifier

Energi- og proteinberikning som skal tilsettes morsmelk for å berike kosten til premature spedbarn.

Nutriprem breastmilk fortifier er et energi- og proteintilskudd for berikning av morsmelk til premature spedbarn. Nutriprem er basert på delvis hydrolysert kumelkprotein med andelen 50 % myseprotein og 50 % kasein. I tillegg inngår vitaminer, mineraler og sporstoff, med unntak av jern som ikke er tilsatt. Nutriprem kommer i doseringsposer på 2,2 g. Normaldosering er 2 poser pr. 100 ml morsmelk.



Bestillingsinformasjon

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Nutriprem breastmilk fortifier, pulver, doseringsposer (2,2 g)	903945	4 x 50 x 2,2 g

Næringsinnhold pr. 100 g og 2,2 g (1 doseringspose) av Nutriprem breastmilk fortifier:

		pr. 100 g	pr. 2,2 g*			pr. 100 g	pr. 2,2 g*
ENERGI	kcal	347	8	VITAMINER			
	kJ	1475	33	A	µg-RE	5275	116
Protein	g	25,2	0,6	D ₃	µg	115	2,5
myse	g	12,5	0,3	E	mg α-TE	60	1,3
kasein	g	12,5	0,3	K ₁	µg	144	3,2
FETT	g	0	0	Tiamin	mg	3,005	0,066
Karbohydrat	g	62,2	1,4	Riboflavin	mg	3,922	0,087
Sukkerarter	g	5,5	0,1	Niacin (inkl. tryptofan)	mg NE	59	1,3
glukose	g	1,1		Pantotensyre	mg	17,201	0,379
laktose	g	0,4		B ₆	mg	2,523	0,056
maltose	g	4,0	0,1	Folsyre	µg	688	15
Polysakkarider	g	51,6	1,2	B ₁₂	µg	4,6	0,10
MINERALER				Biotin	µg	57	1,3
Natrium	mg (mmol)	803 (34,9)	18 (0,8)	C	mg	275	6,0
Kalium	mg (mmol)	528 (13,5)	12 (0,3)				
Klor	mg (mmol)	573 (16,2)	13 (0,4)				
Kalsium	mg (mmol)	1491 (37,2)	33 (0,8)				
Fosfor	mg (mmol)	872 (28,2)	19 (0,6)				
Magnesium	mg	115	2,5				
Ca/P ratio		1,7					
Jern	mg						
Sink	mg	14	0,31				
Kopper	µg	803	18				
Mangan	µg	183	4,1				
Selen	µg	39	0,9				
Jod	µg	252	5,5				

*2,2 g = 1 pose. Normal dosering er 1 pose som blandes i 50 ml morsmelk (37°C).

- Indikasjon:** Energi- og proteinberikning til morsmelk for premature spedbarn. Inneholder i tillegg vitaminer, mineraler og sporstoff, med unntak av jern som ikke er tilsatt.
- Dosering:** Bør doseres etter morsmelkens innhold funnet ved analyse og det premature barnets behov. Normaldosering er en doseringspose (2,2 g) til 50 ml morsmelk. Skal kun doseres av lege.
- Kontraindikasjoner:** Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser. Produktet skal ikke brukes til berikning av verken standard morsmelkerstatninger eller morsmelkerstatninger til premature. Kun til enteralt bruk. Skal ikke brukes intravenøst. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.
- Forsiktighetsregler:** Nutriprem skal kun brukes under tett oppfølging av spesialist i nyfødtdmedisin. Bruk av Nutriprem skal overvåkes nøye dersom barnet behandles med deksametason fordi det induserer en katabolsk effekt som øker plasmakonsentrasjonen av urea og aminosyrer.
- Administrasjon:** Nutriprem er ikke sterilt. Følg instruksene nøye, og bruk kun rene redskap ved tilbredning. Vær nøye med hygiene ved tilbredning og bruk av produktet. Tilbered maten til hvert enkelt måltid og server umiddelbart. Skal inntas innen 2 timer. Ubenyttet løsning skal kastes. Vær oppmerksom på at det på posene kun står: Breast Milk Fortifier.
- Holdbarhet:** 2 år fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato finnes på eskens lokk og på posenes langside. Åpnede doseringsposer skal kastes.
- Oppbevaring:** Lagres tørt og mellom 4 – 25° C.