

Bruk Neocate som ditt hjelpemiddel i diagnostikken av KMPA

Tre enkle steg til en rask og sikker diagnose

1 Vurder sannsynligheten for KMPA
Gjennomgå sykehistorie og familieanamnese

2 Ved mistanke om KMPA – forsøk Neocate

3 Verifiser KMPA diagnosen
Følg opp etter 2–4 uker



Dersom symptomene vedvarer

Dersom symptomene vedvarer er det usannsynlig at det er KMPA

Vurder andre diagnoser



Symptomene forsvinner

Vurder kostprovokasjon



Neocate – 25 års erfaring med KMPA



Et sikkert valg både til diagnostikk og behandling av KMPA

- Gir rask og sikker diagnose ved KMPA
- Godt dokumentert og med lang klinisk erfaring
- God smak gir enkel introduksjon og god compliance
Ikke alle aminosyreprodukter smaker likt. Gjennom produkterfaring i 25 år har vi utviklet Neocateprodukter med god smak
- Alderstilpassede produkter
Barn i ulike aldre har ulike ernæringsmessige behov

Neocate



0–1 år

Neocate Active



Fra 1 år

Referanser: 1. Vandenplas Y. et al. Arch Dis Child 2007; 92:902-908. 2. Host A. & Halken S. Allergy 1990; 45:587-596. 3. Sladkevicius E. & Guest J. Management of cow milk allergy in the UK. Abstract presented at WCPGHAN 2008. 4. Sicherer S. et al J. Pediatr 2001; 138:688-693 5. Vanto T. et al. Allergy 1999; 54:837-842. 6. Vanderhoof JA. et al. J Pediatr 1997; 131:741-744. 7. Latcham et al. J Pediatr 2003; 143:39-47 8. De Boissieu. J Pediatr 1997; 131:744-777.

Besøk vår nye webside: www.shs-nutrition.com/no



Nutricia Norge AS | Holbergsgt. 21 | N-0166 Oslo
Tlf. +47 23 00 21 00 Fax +47 23 00 21 01
e-post nutricia@nutricia.no | www.nutricia.no



Kan det være kumelkallergi?



For rask symptomlindring og sikker diagnose – start med Neocate.




Kumelkproteinallergi (KMPA) – en plagsom tilstand

En vanlig og alvorlig sykdom blant små barn

- 2–7,5 % av små barn har symptomer på KMPA¹
- Vanligst med to eller flere symptomer²
- Symptomene behandles ofte isolert, uten å sees i sammenheng med hverandre

Symptomer på KMPA²



Symptomene er ofte komplekse og det gjør diagnostikken tidkrevende og utfordrende

3,7
måneders på å
stille diagnosen³


Neocate
Se bedring innen 3 til 14 dager

De diagnostiske testene har **store begrensninger**, og er ofte til liten hjelp i utredningen

- De vanlige allergitestene (Prikk og RAST) gir bare svar på IgE-status^{4,5}
- Ca. 50 % av KMPA barn har Non-IgE/T-celle mediert allergi¹

Gullstandarden for å stille en sikker diagnose på KMPA er eliminasjonsdiett til symptomene forsvinner. Deretter skal provokasjonsforsøk gjennomføres¹

Tåler alle barn hydrolyserte produkter?

- Høygradig hydrolyserte produkter (eHF) kan føre til allergisk reaksjon^{4,6}
- Opptil 29% av KMPA pasienter er intolerante til eHF⁷
- Barn som har reaksjoner mens de er eksklusivt brysternært reagerer oftere på eHF⁷


Når ser man reaksjoner³?

	Hud og GI-sympt	Kun GI-sympt	Kun hud-sympt	Urticaria og assosierte sympt
Intoleranse til soya	8%	12%	11%	4%
Intoleranse til eHF	31%	21%	17%	19%
Intoleranse til myse- eHF	25%	10%	0%	20%
Intoleranse til kasein-eHF	37%	29%	9%	4%
Intoleranse til AAF	0%	0%	0%	0%

Neocate gir rask og **sikker diagnose** av KMPA

Gullstandarden innen hypoallergene erstatningsprodukter

- 100 % aminosyrebasert
- Fremstilt i helt kumelfritt miljø



- Gastrointestinale symptomer bedres innen 3 dager⁸
- Alle andre symptomer på KMPA bedres innen 14 dager⁶

Neocate gir rask og sikker diagnose av KMPA i løpet av kun 2 uker


Neocate
Se bedring innen 3 til 14 dager