

# Nutriprem breastmilk fortifier

Energi- og proteinberikning som skal tilsettes morsmelk for å berike kosten til premature spedbarn.

**Nutriprem breastmilk fortifier** er et energi- og proteintilskudd for berikning av morsmelk til premature spedbarn. Nutriprem er basert på hydrolysert kumelkprotein med andelen 60% myseprotein og 40% kasein. I tillegg inngår vitaminer, mineraler og sporstoff, med unntak av jern som ikke er tilsatt. Nutriprem kommer i doseringsposer på 2,1g. Normaldosering er 2 poser pr. 100 ml morsmelk.



## Bestillingsinformasjon

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Nutriprem breastmilk fortifier, pulver, doseringsposer (2,1g)	902960	4 x 50 x 2,1g

## Næringsinnhold pr. 100g og 2,1g (1 doseringspose) av Nutriprem breastmilk fortifier:

		pr. 100g	pr. 2,1g*			pr. 100g	pr. 2,1g*
<b>ENERGI</b>	kcal	361	8	<b>VITAMINER</b>			
	KJ	1535	30	A	µg-RE	3090	65
<b>Protein</b>	g	19	0,4	D	µg	119	2,5
myse	g	11,4	0,2	E	mg α-TE	62	1,3
kasein	g	7,6	0,2	α-tokoferol	mg	84	1,8
<b>FETT</b>	g	0	0	K	µg	150	3,1
<b>Karbohydrat</b>	g	71,5	1,5	Tiamin	mg	3,1	0,06
Sukkerarter	g	4,9	0,1	Riboflavin	mg	4,0	0,08
glukose	g	1,0		Niacin	mg	55	1,1
laktose	g	0,7		Niacin (inkl. tryptofan)	mg NE	58	1,2
maltose	g	3,1	0,1	Pantotensyre	mg	18	0,37
Polysakkarider	g	62,4	1,3	B <sub>6</sub>	mg	2,6	0,05
<b>MINERALER</b>				Folsyre	µg	1188	25
Natrium	mg (mmol)	235 (10,1)	5 (0,22)	B <sub>12</sub>	µg	4,8	0,10
Kalium	mg (mmol)	184 (4,6)	4 (0,1)	Biotin	µg	59	1,2
Klor	mg (mmol)	166 (4,6)	3 (0,08)	C	mg	285	6,0
Kalsium	mg (mmol)	1545 (38,6)	32 (0,8)				
Fosfor	mg (mmol)	1070 (34,2)	22 (0,7)				
Magnesium	mg	143	3				
Ca/P ratio	mg	1,4					
Jern	mg						
Sink	mg	9,5	0,20				
Kopper	mg	0,62	0,01				
Mangan	µg	190	4,0				
Jod	µg	261	5,5				

\*2,1g = 1 pose. Normal dosering er 1 pose som blandes i 50 ml morsmelk

- Indikasjon:** Energi- og proteinberikning til morsmelk for premature spedbarn (< 37 ukers svangerskap), spesielt de med svært lav fødselsvekt (< 1500g). Inneholder i tillegg vitaminer, mineraler og sporstoff, med unntak av jern som ikke er tilsatt.
- Dosering:** Bør doseres etter morsmelkens innhold funnet ved analyse og det premature barnets behov. Normaldosering er en doseringspose (2,1g) til 50 ml morsmelk. Skal kun doseres av lege.
- Kontraindikasjoner:** Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser. Produktet skal ikke brukes til berikning av verken standard morsmelkerstatninger eller morsmelkerstatninger til premature. Kun til enteralt bruk. Skal ikke brukes intravenøst.
- Forsiktighetsregler:** Nutriprem skal kun brukes under tett oppfølging av spesialist i nyfødtdmedisin. Bruk av Nutriprem skal overvåkes nøye dersom barnet behandles med deksametason fordi det induserer en katabolsk effekt som øker plasmakonsentrasjonen av urea og aminosyrer.
- Administrasjon:** Nutriprem er ikke sterilt. Følg instruksene nøye, og bruk kun rene redskap ved tilbredning. Vær nøye med hygiene ved tilbredning og bruk av produktet. Vær oppmerksom på at det på posene kun står: Breast Milk Fortifier.
- Holdbarhet:** 2 år fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato finnes på eskens lokk og på posenes langsideside. Åpnede doseringsposer skal kastes. Utblandet Nutriprem i morsmelk skal brukes rett etter utblanding. Ubenyttet løsning kastes.
- Oppbevaring:** Lagres tørt og mellom 4 – 25° C.