

Nutrison Concentrated

Energitett sondeernæring med lavt innhold av elektrolytter. Fullverdig i lavt volum. Til pasienter med elektrolytt- og væskerestriksjoner.

Fiberfri. Glutenfri. Klinisk laktosefri.

Nutrison Concentrated er en meget konsentrert sondeløsning med en energitetthet på 2 kcal/ml. Lavt innhold av elektrolytter/mineraler. Dekker behovet for andre næringsstoffer i 750 ml (1500 kcal).

Proteininnholdet i **Nutrison Concentrated** er normalt, 15 E%.

Nutrison Concentrated inneholder også en blanding av naturlige karotenoider som er viktige bestanddeler i frukt og grønnsaker. De positive effekter av karotenoider er mye av bakgrunnen for rådet om å spise 5 frukt og grønt om dagen.



Bestillingsinformasjon

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Nutrison Concentrated	851456	8 x 500 ml pack

Næringsinnhold pr. 100 ml Nutrison Concentrated:

ENERGI	kcal	200	VITAMINER		
	kJ	840	A	µg RE	164
PROTEIN	g	7,5	Karotenoider	mg	0,40
nitrogen	g	1,2	D	µg	1,4
kasein	g	6,0	E	mg α-TE	2,5
myse	g	1,5	K	µg	11
N:Non protein energy		1:145	B ₁	mg	0,30
FETT	g	10,0	B ₂	mg	0,32
mettet	g	1,0	Niacin	mg-NE	3,6
enumettet	g	6,0	Pantotensyre	mg	1,1
flerumettet	g	3,0	B ₆	mg	0,34
linolsyre	g	2,33	Folsyre	µg	53
α-linolensyre	g	0,46	B ₁₂	µg	0,42
KARBOHYDRAT	g	20,1	Biotin	µg	8,0
sukkerarter	g	1,6	C	mg	20
laktose	g	<0,025	Kolin	mg	73
polysakkarider	g	18,0	ENERGIFORDELING		
andre	g	0,5	Protein	E%	15,0
KOSTFIBER	g	-	Fett	E%	45,0
MINERALER			Karbohydrat	E%	40,0
Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)	VANN	ml	71
Kalium	mg (mmol)	180 (4,6)	Osmolaritet	mOsmol/l	335
Klor	mg (mmol)	80 (2,3)	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	470
Kalsium	mg (mmol)	80 (2,0)	Potential Renal		
Fosfor	mg (mmol)	75 (2,4)	Solute Load	mOsmol/l	556
Magnesium	mg (mmol)	45 (1,9)	Viskositet	mPa.s	124
Jern	mg	3,2	Surhetsgrad	pH	6,61
Sink	mg	2,4			
Kopper	µg	360			
Mangan	mg	0,66			
Fluor	mg	0,20			
Molybden	µg	20			
Selen	µg	11			
Krom	µg	13			
Jod	µg	27			

Indikasjon: Pasienter med elektrolytt- og væskerestriksjoner, men som tåler et normalt proteininntak. For eksempel pasienter med nyresvikt som får dialysebehandling, pasienter med leversvikt, og pasienter med hjertesvikt.

Dosering: Fullverdig med unntak av elektrolytter i 750 ml (1500 kcal).

Kontraindikasjoner: Spedbarn. Pasienter med galaktosemi. Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler: Anvendes med forsiktighet til barn fra 1-6 år.

Administrasjon: Enteral ernæringspumpe gir tryggest administrasjon. Ved bruk av gravitasjonssett bør Ch ≥10.

Holdbarhet: 9 måneder fra produksjonsdato. Etter åpning, 24 timer. Holdbarhetsdato på pakningen.

Oppbevaring: Lagres tørt og mellom 5 – 25° C.