

Nutrison MCT

Fullverdig sondeernæring rik på MCT fett og protein. Til pasienter med fettmalabsorpsjon.

Fiberfri. Glutenfri. Klinisk laktosefri.

Nutrison MCT har en energitetthet på 1,0 kcal/ml. Fullverdig i 1500 ml (1500 kcal).

Nutrison MCT inneholder 30 E% fett, hvorav 60% er MCT fett. MCT fett fordøyes lettere enn vanlig fett og kan dermed bli et viktig bidrag til energiinntaket. **Nutrison MCT** har økt innhold av protein (20 E%) av hensyn til økt proteinbehov ved malabsorpsjon.

Nutrison MCT inneholder også en blanding av naturlige karotenoider som er viktige bestander i frukt og grønnsaker. De positive effekter av karotenoider er mye av bakgrunnen for rådet om å spise 5 frukt og grønt om dagen.



Bestillingsinformasjon

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Nutrison MCT	816952	8 x 1000 ml pack

Næringsinnhold pr. 100 ml Nutrison MCT:

ENERGI	kcal	100	VITAMINER		
	kJ	420	A	µg RE	82
PROTEIN	g	5,0	Karotenoider	mg	0,20
nitrogen	g	0,8	D	µg	0,70
kasein	g	5,0	E	mg α-TE	1,3
N:Non protein energy		1:102	K	µg	5,3
FETT	g	3,3	B ₁	mg	0,15
mettet	g	2,3	B ₂	mg	0,16
MCT	g	2,0	Niacin	mg-NE	1,8
enumettet	g	0,6	Pantotensyre	mg	0,53
flerumettet	g	0,4	B ₆	mg	0,17
linolsyre	g	0,28	Folsyre	µg	27
α-linolensyre	g	0,05	B ₁₂	µg	0,21
KARBOHYDRAT	g	12,6	Biotin	µg	4,0
sukkerarter	g	1,0	C	mg	10
laktose	g	<0,025	Kolin	mg	37
polysakkarider	g	11,2	ENERGIFORDELING		
andre	g	0,4	Protein	E%	20,0
KOSTFIBER	g	-	Fett	E%	30,0
MINERALER			Karbohydrat	E%	50,0
Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)	VANN	ml	85
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)	Osmolaritet	mOsmol/l	265
Klor	mg (mmol)	125 (3,5)	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	315
Kalsium	mg (mmol)	80 (2,0)	Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	419
Fosfor	mg (mmol)	72 (2,3)	Viskositet	mPa.s	10
Magnesium	mg (mmol)	23 (0,9)	Surhetsgrad	pH	6,7
Jern	mg	1,6			
Sink	mg	1,2			
Kopper	µg	180			
Mangan	mg	0,33			
Fluor	mg	0,10			
Molybden	µg	10			
Selen	µg	5,7			
Krom	µg	6,7			
Jod	µg	13			

Indikasjon: Sondeernæring til pasienter med fettmalabsorpsjon.

Dosering: Fullverdig i 1500 ml (1500 kcal).

Kontraindikasjoner: Spedbarn. Pasienter med galaktosemi. Langtkommet levercirrhose. Andre kontraindikasjoner kan være pasienter med diabetes, pasienter med ketose og pasienter med acidose da MCT fett kan forverre metabolsk acidose.
Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler: Anvendes med forsiktighet til barn fra 1-6 år.
Introduseres gradvis for å unngå gastrointestinal intoleranse pga. MCT fett.

Administrasjon: Enteral ernæringspumpe gir tryggest administrasjon.
Ved bruk av gravitasjonssett bør Ch ≥8.

Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato. Etter åpning – 24 timer. Holdbarhetsdato på pakningen.

Oppbevaring: Lagres tørt og mellom 5 – 25° C.